

Nota informativa**Recomanacions per a una Broncofibroscòpia**

- Acudir a la realització de la prova totalment en dejú de almenys 6 hores (líquids inclosos), ni haver fumat.
- És imprescindible que aporti les darreres radiografies de tòrax o TAC toràcic el dia de l'exploració, així com una analítica bàsica que inclogui coagulació.
- No es podrà realitzar l'exploració si vostè està sota algun tractament anticoagulant (Sintrom o heparina).
- Recordi que després de l'exploració haurà de romandre en dejú durant 2 hores més (líquids inclosos).
- Si durant l'exploració se li ha administrat algun sedant no deu de conduir automòbils ni fer servir maquinària perillosa en les hores següents. És aconsellable que vingui acompanyat/da.
- És possible presentar febre d'escassa consideració en les hores que segueixen a la realització de la prova, o inclús un aïllat esput amb sang si s'ha realitzat alguna biòpsia. Si persisteix la febre passades 24 hores o l'expectoració no remet, ha de consultar al seu metge habitual o trucar al Servei d'Endoscòpia (Tel. 93 552 27 00 Ext. 739913; de 9h a 14h).

Nota informativa**Recomendaciones para una Broncofibroscopia**

- Acudir a la realización de la prueba totalmente en ayunas de al menos 6 horas (líquidos incluidos), ni haber fumado.
- Es imprescindible que aporte las últimas radiografías de tórax o TAC torácico el día de la exploración, así como una analítica básica que incluya coagulación.
- No se podrá realizar la exploración si usted está en tratamiento anticoagulante (Sintrom o heparina).
- Recuerde que después de la exploración tendrá que permanecer de en ayunas durante 2 horas más (líquidos incluidos).
- Si durante la exploración se le ha administrado algún sedante no debe conducir automóviles ni utilizar maquinaria peligrosa en las horas siguientes. Es aconsejable que venga acompañado/a.
- Es posible presentar fiebre de escasa consideración en las horas que siguen a la realización de la prueba, o incluso un aislado esputo con sangre si se ha realizado alguna biopsia. Si persiste la fiebre pasadas 24 horas o la expectoración no remite, ha de consultar a su médico habitual o llamar al Servicio de Endoscopia (Tel. 93 552 27 00 Ext. 739913; de 9h a 14h).