

1. Prendre “Duphalac Solución®” segons la pauta següent:
 - a. 3 cullerades/ dia durant els 3 dies següents.
 - b. 2 cullerades/ dia durant els 2 dies següents.
 - c. 1 cullerada/ dia durant els 20 dies restants.

Nota: Si les deposicions dels 5 primers dies comencen sent molt abundants, sense deixar el laxant, redueixi la dosi a 1 cullerada/ dia.

2. No prendre antiagregants plaquetaris com ara els antiinflamatoris (Aspirina®, Tromalyt®, etc.) o qualsevol dels seus derivats durant els propers 20 dies.
 3. Realitzar dieta tova durant 1 dia (triturats, verdures bullides, carns a la planxa, iogurts, etc.)
 4. No realitzar exercicis ni esforços en 48 hores, especialment exercicis abdominals.
 5. En cas de dubtes consultar amb el seu metge.
 6. Davant la presència de sagnat abundant o dolor abdominal intens, acudir a urgències.
-

1. Tomar “Duphalac Solución®” según la siguiente pauta:
 - a. 3 cucharadas/ día durante los siguientes 3 días.
 - b. 2 cucharadas/ día durante los siguientes 2 días.
 - c. 1 cucharada/ día durante los 20 restantes días.
 - d. *Nota: Si las deposiciones de los 5 primeros días empiezan siendo muy abundantes, sin dejar el laxante, reduzca la dosis a 1 cucharada/ día.*
 2. No tomar antiagregantes plaquetarios como los antiinflamatorios (Aspirina®, Tromalyt®, etc.) o cualquiera de sus derivados durante los próximos 20 días.
 3. Realizar dieta blanda durante 1 día (triturados, verduras hervidas, carnes a la plancha, yogures, etc.)
 4. No realizar ejercicios ni esfuerzos en 48 horas, especialmente ejercicios abdominales.
 5. En caso de dudas consultar con su médico.
 6. Ante la presencia de sangrado abundante o dolor abdominal intenso, acudir a urgencias.
-