
Administración de medios de contraste yodados



PARTE DE **Bupa**

Su médico responsable ha solicitado que le realicemos una exploración que puede requerir la inyección de un **Contraste Yodado**. Si el Radiólogo responsable de su exploración, estima que la solicitud está justificada y lo considera estrictamente necesario, le será puncionada una vena del antebrazo para la inyección de dicho producto.

En general, este contraste se utiliza para estudiar mejor un órgano determinado, una lesión encontrada o para excluir con carácter definitivo algunos tipos de lesión dudosa. La administración de Contraste Yodado es necesaria en aproximadamente el 60% de nuestros pacientes en TAC. **En nuestro Servicio de Radiología utilizamos exclusivamente medios de contraste yodado no iónicos.**

Aunque los medios de Contraste Yodados no Iónicos se encuentran entre los productos más seguros usados en medicina, no están completamente exentos de riesgos, derivados esencialmente de una posible alergia al mismo, por lo que es muy importante que Vd. sepa lo siguiente:

- 1º. No es posible saber con antelación que paciente puede presentar una reacción adversa al contraste aunque es muy poco probable que esto ocurra.
- 2º. Con carácter general las reacciones que se pueden presentar son las siguientes:
 - Reacciones Leves: Son las más frecuentes. Síntomas: náuseas, calor generalizado y, enrojecimiento de la cara. No necesitan tratamiento y, ceden espontáneamente en pocos minutos.
 - Reacciones Moderadas: Se presentan como urticaria limitada, prurito, rinitis, conjuntivitis, edema, broncoespasmo leve y vómitos. Se corrigen fácilmente con la medicación adecuada.
 - Reacciones Graves: Ocurren en aproximadamente 4 por cada 10.000 personas a las que se le administra contraste. La sintomatología es urticaria generalizada, edema de laringe, angioedema, hipotensión, broncoespasmo, dolor torácico, edema pulmonar, arritmia cardíaca, convulsiones, insuficiencia renal aguda y shock. Generalmente se corrigen también con tratamiento adecuado.

Con carácter excepcional podría producirse la muerte, 0,27 por cada millón de exploraciones, por lo que este riesgo es muy remoto (muy inferior al riesgo que tiene cualquier persona de morir, por ejemplo en un accidente de tráfico: 100 muertes por cada un millón de personas).

¡¡ RECUERDE QUE ES IMPRESCINDIBLE VENIR CON 6 HORAS DE AYUNO !!