
Recomendaciones al alta de paciente pediátrico con administración de nebulizadores (Hospital La Zarzuela, Hospital La Moraleja, Hospital CIMA)

Material

- Dispositivo nebulizador (Mascarilla de aerosoles, nebulizador portátil)
- Suero fisiológico y jeringa para introducirlo en el recipiente del nebulizador.
- Medicación prescrita (si la hubiera)

Procedimiento

- Lavarse las manos
- Introducir en el recipiente del nebulizador la solución de suero fisiológico (Según pauta del Pediatra) y mezclar con el fármaco prescrito (si lo hubiese)
- Conectar la mascarilla a la cazoleta (que contiene la medicación) y al sistema que conecta con el nebulizador portátil.
- La aplicación del nebulizador no debe sobrepasar los 15 minutos de duración.
- Al finalizar enjuague bucal con agua. En caso de administrar corticoides, enjuagar con Bicarbonato 1 molar.
- Las recomendaciones pueden variar según las indicaciones de cada fabricante.

Mantenimiento

- Una vez terminado, retirar, desconectar y lavar la mascarilla y el recipiente del nebulizador con agua y jabón y dejar secar.

Bibliografía

- Salud Madrid. 2013. Disponible en: <http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352819764175&ssbinary=true>
- Generalitat de Catalunya Servicio de Salud. 2013. Disponible en: http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/boletin_errores_medicacion/documents/arxius/but_EM_v10_n1_CAST.pdf
- Nebulizador pediátrico. Disponible en: <http://nebulizadores.com.mx/nebulizador-pediatrico>