

---

---

# PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CISTOSCOPIA

---

---



PARTE DE *Bupa*

Para la correcta realización de la prueba debe:

- Tomará CIPROFLOXACINO 500 mg, 1/12 horas el día antes de la exploración, el mismo día y tres días después.
- No precisa ayunar, excepto si se realiza con sedación donde son necesarias 6 horas de ayuno.

Por favor, si tiene alergias a CIPROFLOXACINO lo debe comunicar al médico para que le prescriba otra profilaxis antibiótica

Fecha de la prueba: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_, a las \_\_\_\_\_

---

---

# PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CISTOSCOPIA

---

---



PARTE DE *Bupa*

Para la correcta realización de la prueba debe:

- Tomará CIPROFLOXACINO 500 mg, 1/12 horas el día antes de la exploración, el mismo día y tres días después.
- No precisa ayunas, excepto si se realiza con sedación donde son necesarias 6 horas de ayuno.

Por favor, si tiene alergias a CIPROFLOXACINO lo debe comunicar al médico para que le prescriba otra profilaxis antibiótica

Fecha de la prueba: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_, a las \_\_\_\_\_